مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
دوره ۶. شماره ۴. زمستان ۱۳۹۷

مقاله پژوهشی

اثر دو ماه تمرین مقاومتی با و بدون مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش‌های صحرایی مسموم شده با ناندرلون

افشین رستمی[۱]، سیدعلی حسینی*[۲]، محمدعلی آذربایجانی[۳]

۱. گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
۲. گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
۳. گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ناندرلون از مشتقات تستوسترون می‌باشد که با افزایش ساخت پروتئین، سبب بزرگ شدن اندازه عضله شده و مورد سوء استفاده ورزشکاران قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تمرین مقاومتی و مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش‌های صحرایی مسموم شده با ناندرلون انجام شد.

روش‌ها: ۴۰ سر موش صحرایی انتخاب و در ۸ گروه (۱. کنترل، ۲. شم، ۳. ناندرلون، ۴. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی، ۵. ناندرلون همراه با ۱۲/۵ کروسین میلی‌گرم بر کیلوگرم، ۶. ناندرلون همراه با ۲۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین، ۷. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و ۱۲/۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین و ۸. ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و ۲۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین) تقسیم شدند. گروه‌های ۴، ۷ و ۸ به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی را انجام دادند و گروه‌های ۵- ۸ روزانه به میزان تجویز شده کروسین دریافت کردند. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و تعقیبی بنفرونی استفاده شد .

نتایج: ۲۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین (P=۰/۰۰۲)، تمرین + ۱۲/۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین (P=۰/۰۰۳) و تمرین + ۲۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین (P=۰/۰۰۱) باعث کاهش معنادار سطح یا فعالیت کاتالاز گردید؛ تمرین + ۱۲/۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین (P=۰/۰۰۱) و تمرین + ۲۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین (P=۰/۰۰۱) نسبت به تمرین اثر معنی داری بیشتری بر کاهش کاتالاز نشان داد؛ ۱۲/۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم کروسین باعث افزایش معنا دار سطح یا فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز گردید (P=۰/۰۲).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد مصرف همزمان کروسین و تمرینات مقاومتی دارای اثرات تعاملی آنتی‌اکسیدانی در موش‌های صحرایی مسموم شده با ناندرلون نمی باشند.

کلید واژه‌ها:
ناندرلون، تمرین، کروسین، کاتالاز، گلوتاتیون پروکسیداز

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه محفوظ است.

مقدمه

ناندرلون از مشتقات تستوسترون است و در مقایسه با آن دارای اثرات آنابولیک بیشتر و آندروژنیک کمتر می‌باشد (۱). این ماده با افزایش ساخت پروتئین، سبب بزرگ شدن اندازه عضله شده و مورد سوءاستفاده ورزشکاران قرار گرفته‌است؛ به همین دلیل این ترکیب جزء مواد نیروزا یا دوپینگ محسوب می‌شود (۱، ۲). مصرف این ترکیب ممکن است باعث بروز اثرات جانبی در عضله قلب مانند از هم‌گسستگی سنسیتیوم قلب (۳) و تضعیف عملکرد آن (٤)، تحریک سیگنالینگ مرگ سلولی (٥) و

*آدرس نویسنده مسئول: مرودشت، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه فیزیولوژی ورزشی
آدرس پست الکترونیک: alihoseini_57@miau.ac.ir

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

همراه با انفارکتوس میوکارد، کاردیومیوپاتی و مرگ ناگهانی شود (٦). اگرچه مصرف آن منجر به بروز آثار خطرناکی می گردد (٣- ٦)، اما به دلیل تجربه آثار مثبت آن توسط ورزشکاران، اغلب عدم مصرف آن از طرف ورزشکاران پذیرفته نمی‌شود. از طرفی فعالیت‌های ورزشی خصوصاً فعالیت‌های شدید باعث ایجاد استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدی و عدم کفایت سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی می‌شود (٧)، که این موضوع صرفا مربوط به فعالیت‌های هوازی نیست و سایر فعالیت‌های ورزشی و جسمانی شدید از جمله تمرینات مقاومتی نیز موجب تولید رادیکال‌های آزاد در عضلات اسکلتی و سایر بافت‌ها از جمله بافت قلب می‌شود (٨، ٩). در مورد فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی به دنبال تمرینات ورزشی نتایج متفاوت و گاهاً متناقضی دیده می‌شود. برای مثال در مطالعه‌ای افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بعد از تمرینات ورزشی گزارش شد (١٠) همچنین محققین نشان دادند فعالیت های ورزشی کوتاه مدت سطوح پلاسمایی مالون دی آلدئید و اریتروسیت ها را افزایش می دهد با این وجود پس از نه ماه تمرینات منظم و مداوم سطوح مالون دی آلدئید کاهش می یابد (١١، ١٢). از سویی موجودات زنده شبکه آنتی اکسیدانی پیچیده ای را برای خنثی کردن گونه های فعال اکسیژن که برای زندگی انسان مضر هستند، ایجاد کرده اند. آنتی اکسیدان ها از سیستم های بیولوژیک نظیر پروتئین، آمینو اسید، لیپید و DNA، در مقابل صدمات اکسیداتیو تولید شده به وسیله گونه های فعال اکسیژن (ROS) حمایت می کنند و منجر به کاهش آسیب و یا مرگ سلولی، بیماری های قلبی- عروقی و سرطان ها می شوند. از این رو در سال های اخیر تحقیق برای یافتن آنتی اکسیدان های جدید، با منشا گیاهی به دلیل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی که انتشار وسیعی در گیاهان از جمله زعفران دارند مورد توجه قرار گرفته است (١٣).

زعفران با دارا بودن خواص آنتی‌اکسیدانی سلامت قلب و عروق را تامین می کند، همچنین از زعفران به عنوان عامل کاردیوتونیک نام برده شده است و از این گیاه در درمان تپش قلب استفاده می‌شده است (١٤). کروسین یک ماده فعال زیست شناختی است که از زعفران استخراج می‌شود و دارای خواص متعددی از جمله آنتی‌اکسیدانی، ضدسرطان، ضدالتهاب، ضد اسکلروز و محافظت در برابر بیماری‌های قلبی- عروقی است (١٥). کروسین پروکسیداسیون لیپیدی را از طریق غیر فعال کردن رادیکال‌های آزاد (ROS) کاهش می‌دهد (١٦). آثار محافظتی کروسین برآسیب‌های هیپوکسی سلول‌های قلب توسط افزایش فاکتور رشد آندوتلیال عروقی (VEGF) مشخص شده است؛ بعلاوه کروسین در هیپرتروفی قلبی القاء شده با نوراپی‌نفرین با مهار پروکسیداسیون چربی‌ها و بهبود فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون پروکسیداز (GPX) اثر حفاظتی ایجاد می نماید (١٧). به نظر می‌رسد کروسین احتمالا آثار منفی ناندرلون بر سلامت قلب و عروق را بهبود می بخشد. با توجه به یافته های ضد و نقیض مطالعات گزارش شده و نظر به اینکه اثرات منفی استفاده از ناندرلون و همچنین آثار منفی رادیکال‌های آزاد رهاشده در بافت ناشی از فعالیت شدید ورزشی در کنار همدیگر می‌تواند آثار تخریبی زیادی را در بافت‌های مختلف بدن ایجاد کند، از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات تمرین مقاومتی و مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پروکسیداز بافت قلب موش‌های صحرایی مسموم شده با ناندرلون انجام شد.

روش‌ها

در این مطالعه تجربی ٤٠ سر موش نر نژاد ویستار با سن تقریبی نه هفته‌ای خریداری و به آزمایشگاه حیوانات انتقال داده شدند. موش‌های صحرایی پس از یک هفته سازگاری با محیط آزمایشگاه به طور تصادفی در هشت گروه پنج تایی ١. کنترل، ٢. شم، ٣. مصرف ناندرلون، ٤. مصرف ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی، ٥. مصرف ناندرلون همراه با مصرف mg/kg ١٢/٥ کروسین، ٦. مصرف ناندرلون همراه با مصرف mg/kg ٢٥ کروسین، ٧. مصرف ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و مصرف mg/kg ١٢/٥ کروسین، ٨. مصرف ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و مصرف mg/kg ٢٥ کروسین تقسیم شدند.

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

گروه های ۳ تا ۸ یک بار در هفته ۱۰ mg/kg نانـدرلون سـاخت شرکت ایران هورمون (۱۸) و گروه های ۵ تا ۸ روزانه کروسین ساخت شـرکت زیگمـا کشـور آلمـان را بـا دوزهـای معـین بـه صورت صفاقی دریافت می‌نمودند (۱٤) همچنین گروه ۲ محلول فیزیولوژیک نرمال سالین را روزانه به صورت صفاقی دریافت می‌کردند. موش هـای صـحرایی گـروه هـای ٤، ۷ و ۸ بـه مـدت هشت هفته و سه جلسه در هفتـه تمرینـات مقـاومتی صـعود از نردبـان یـک متـری را انجـام دادنـد. در ایـن مطالعـه تمرینـات مقاومتی شامل هشت هفته صعود از نردبان یک متری با ۲٦ پله و شیب ۸۵ درجه بود. هر جلسه شامل سه سـت بـا پـنج تکـرار می‌شد، در فاصله هر تکرار یک دقیقه و در فاصله بین هـر سـت دو دقیقه استراحت گنجانده شده بود. تمرین پس از بستن وزنـه به دم موش صحرایی انجام می‌شد. در هفتـهٔ اول میـزان وزنـه-های بسته شده به دم موش‌ها ۵۰ درصد وزن بدن آن‌ها بود که ۱۰ درصد در هر هفته افزایش یافته به طوری که در هفته پایانی به ۱۲۰درصد رسید. حیوانات در طول هفته‌هـای قبـل از شـروع تمرینات با صعود از نردبان آشنا شدند که در صورت امتناع بـا تحریک دستی وادار به صعود می‌شدند. گروه کنترل نیـز جهـت تجربهٔ کلیهٔ شرایط موجـود در محـل تمرینـات حضـور داشـتند (۱۹). در پایان دوره تحقیق موش‌های صحرایی با دی اتیـل اتـر ساخت شرکت مرک آلمان بیهوش شدند با شکافتن سینه مـوش های صحرایی، قلب آنها استخراج و تا زمان سـنجش متغیرهـای تحقیق در دمای ۲۰ درجه زیر صفر نگهداری شد. سطوح کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلـب مـوش هـای صـحرایی و بـا دستگاه الایزاریدر و همچنین با روش رادیوایمونواسـی انـدازه-گیری شد.

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق با استفاده از نـرم افـزار SPSS نسخه ۲۱ صورت گرفت. جهت بررسی طبیعی بودن توزیع یافته ها از آزمون شاپیرو – ویلک اسـتفاده شـد. همچنـین از آزمـون آنالیز واریانس یـک طرفـه بـه همـراه آزمـون تعقیبـی بنفرونـی اسـتفاده گردیـد. سـطح معنـی داری تمـامی آزمونهـای آمـاری $p\leq ۰/۰۵$ در نظر گرفته شد.

نتایج

سطوح کاتالاز و گلوتـاتیون پراکسـیداز بافـت قلـب مـوش هـای صحرایی گروه های هفت گانـه تحقیـق در جـدول ۱ ارائـه شـده است. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت آماری معنی داری در سـطوح کاتـالاز (P=۰/۰۰۱) و گلوتـاتیون پراکسـیداز (P=۰/۰۰۱) بافت قلـب مـوش هـای صـحرایی مسـموم شـده بـا نانـدرلون نشـان داد (جـدول ۲). همچنـین سـطوح کاتـالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش‌های صحرایی در گروه هـای هشـت گانه تحت مطالعه به ترتیب در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شـده است

نتـایج آزمـون تعقیبـی بنفرونـی تفـاوت آمـاری معنـی داری در سطوح کاتالاز گروه های کنترل و شم نشان نـداد. (P=۰/۵۸) بـا ایـن وجـود سـطوح کاتـالاز در گـروه هـای مصـرف نانـدرلون (P=۰/۰۰۱)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین (P=۰/۰۰۱)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا مصـرف ۱۲/۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا مصـرف ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۰۱) و مصرف ناندرلون همراه بـا تمرین و ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱) بـه طـور معنـی داری پایین تر از گروه کنترل بود.

سـطوح کاتـالاز در گـروه هـای مصـرف نانـدرلون (P=۰/۰۰۱)، مصرف ناندرلون همراه با تمرین (P=۰/۰۰۱)، مصرف ناندرلون همراه با مصـرف ۱۲/۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا مصـرف ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱) و مصرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۲۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۰۱) به طور معنی داری پایین تر از گـروه شـم بود.

تفاوت معنی داری در سطوح کاتالاز گروه مصرف ناندرلون بـا گروه مصرف ناندرلون همـراه بـا تمـرین (P=۰/۹۹) و مصـرف نانـدرلون همـراه بـا ۱۲/۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۱٤) مشـاهده نشـد، بـا ایـن وجـود سـطوح کاتـالاز در گـروه هـای مصـرف

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

نانـدرلون همـراه بـا ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۲)، مصـرف ناندرلون همراه با تمرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۰۳) و مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱) بـه طـور معنـی داری پـایین تـر از گـروه مصـرف ناندرلون بدست آمد.

سطوح کاتالاز در گروه های مصرف ناندرلون همراه با مصرف ۱۲/۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۱)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا مصـرف ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱)، مصـرف نانـدرلون همراه با تمرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۰۱) و مصـرف ناندرلون همراه با تمرین و ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۱) بـه طور معنی داری پایین تر از گروه مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمرین بود.

تفاوت آماری معنی داری در سطوح کاتالاز بین گـروه مصـرف ناندرلون همراه با ۱۲/۵ mg/kg کروسین با گروه های ناندرلون همـراه بـا ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹)، مصـرف نانـدرلون همراه با تمـرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) و مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) وجود نداشت.

همچنـین تفـاوت آمـاری معنـی داری در سـطوح کاتـالاز گـروه مصرف ناندرلون همراه با ۲۵ mg/kg کروسین با گروه مصرف ناندرلون همراه با تمـرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) و مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) وجود نداشت. بعلاوه تفـاوت آمـاری معنـی داری در سطوح کاتالاز گروه مصرف ناندرلون همراه با تمرین و mg/kg ۱۲/۵ کروسین با گـروه مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۲۵ mg/kg کروسین مشاهده نشد (P=۰/۹۹).

بـر اسـاس داده هـا، تفـاوت آمـاری معنـی داری در سـطوح گلوتاتیون پراکسیداز بین گروه های کنترل و مصرف نانـدرلون همراه با مصرف ۱۲/۵ mg/kg کروسین بدست نیامـد (P=۰/۹۹) با این وجود سطوح گلوتـاتیون پراکسـیداز در گـروه هـای شـم (P=۰/۰۰۱)، مصـرف نانـدرلون (P=۰/۰۰۹)، مصـرف نانـدرلون همراه با تمرین (P=۰/۰۰۱)، مصرف ناندرلون همراه با مصـرف ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۰۰۵)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۲) و مصـرف نانـدرلون همراه با تمرین و ۲۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۰۲) به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود.

تفاوت آماری معنی داری در سطوح گلوتاتیون پراکسیداز گروه شم با مصرف ناندرلون (P=۰/۹۹)، مصرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین (P=۰/۹۹)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا ۲۵ mg/kg کروسین (P=۰/۹۹)، مصرف ناندرلون همراه با تمرین و mg/kg ۱۲/۵ کروسین (P=۰/۹۹) و مصرف ناندرلون همراه با تمـرین و ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) مشـاهده نشـد، بـا ایـن وجـود سطوح گلوتاتیون پراکسیداز در گروه مصرف نانـدرلون همـراه با ۱۲/۵ mg/kg کروسین به طور معنی داری بالاتر از گروه شم بود (P=۰/۰۰۱).

تفاوت آماری معنی داری در سطوح گلوتاتیون پراکسیداز گروه مصرف ناندرلون با گروه مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین (P=۰/۹۹)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹)، مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) و مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) وجـود نداشـت، بـا ایـن وجـود سطوح گلوتاتیون پراکسیداز در گروه مصرف نانـدرلون همـراه با ۱۲/۵ mg/kg کروسین بـه طـور معنـی داری بـالاتر از گـروه مصرف ناندرلون بود (P=۰/۰۲).

تفـاوت معنـی داری در سـطوح گلوتـاتیون پراکسـیداز گـروه مصرف ناندرلون همراه با تمـرین بـا گـروه مصـرف نانـدرلون همـراه بـا ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹)، مصـرف نانـدرلون همراه با تمـرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) و مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین و ۲۵ mg/kg کروسـین (P=۰/۹۹) وجود نداشـت، گرچـه سـطوح گلوتـاتیون پراکسـیداز در گـروه مصرف ناندرلون همراه با ۱۲/۵ mg/kg کروسین به طور معنـی داری بالاتر از گروه مصـرف نانـدرلون همـراه بـا تمـرین بـود (P=۰/۰۰۱).

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

سطوح گلوتاتیون پراکسیداز در گروه مصرف ناندرلون همراه با ۱۲/۵ mg/kg کروسین به طور معنی داری بالاتر از گروه های گروه مصرف ناندرلون همراه با ۲۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۰۱)، مصرف ناندرلون همراه با تمرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۰۶) و مصرف ناندرلون همراه با تمرین و ۲۵ mg/kg کروسین (P=۰/۰۰۱) بدست آمد.

بر طبق نتایج، تفاوت آماری معنی داری در سطوح گلوتاتیون پراکسیداز در گروه مصرف ناندرلون همراه با ۲۵ mg/kg کروسین با گروه های مصرف ناندرلون همراه با تمرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسین (P=۰/۹۹) و مصرف ناندرلون همراه با تمرین و ۲۵ mg/kg کروسین (P=۰/۹۹) وجود ندارد همچنین تفاوت معنی داری در سطوح گلوتاتیون پراکسیداز در گروه مصرف ناندرلون همراه با تمرین و ۱۲/۵ mg/kg کروسین با گروه مصرف ناندرلون همراه با تمرین و ۲۵ mg/kg کروسین وجود نداشت (P=۰/۹۹).

جدول ۱. سطوح کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در گروه های هشت گانه تحت مطالعه

متغیر گروه	گلوتاتیون پراکسیداز (میانگین± انحراف معیار)	کاتالاز (میانگین± انحراف معیار)
کنترل	۹/۵۸±۲۲۵/۶۵	۱۰/۴۲±۵۶/۶۳
شم	۲/۱۴±۱۵۲/۹۵	۲/۸۲±۶۴/۷۹
ناندرلون	۱۹/۹۴±۱۶۴/۵۴	۸/۴۱±۲۳/۵۶
ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی	۵/۵۷±۱۴۴/۸۰	۴/۱۰±۲۶/۷۸
ناندرلون همراه با مصرف ۱۲/۵ mg/kg کروسین	۲۸/۲۶±۲۳۳/۶۸	۳/۷۹±۱۳/۴۶
ناندرلون همراه با مصرف ۲۵ mg/kg کروسین	۱۹/۵۰±۱۶۱/۹۳	۰/۷۵±۷/۷۵۹۵
ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و مصرف ۱۲/۵ mg/kg کروسین	۴۹/۵۹±۱۷۰/۱۳	۱/۷۷±۸/۸۶
ناندرلون همراه با تمرین مقاومتی و مصرف ۲۵ mg/kg کروسین	۲۰/۲۷±۱۵۵/۸۸	۱/۸۸±۷/۳۱

جدول ۲. اثر تمرین مقاومتی و مصرف کروسین بر کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون

متغیر	مجموع مربعات	درجات آزادی	میانگین مربعات	آماره F	سطح معنی داری
کاتالاز	۱۷۸۷۶/۴۱	۷	۲۵۵۳/۷۷	۹۰/۴۱	۰/۰۰۱
	۹۰۳/۸۱	۳۲	۲۸/۲۴		
	۱۸۷۸۰/۲۳	۳۹			
گلوتاتیون پراکسیداز	۴۰۳۲۵/۱۰	۷	۵۷۶۰/۷۲	۱۰/۰۶	۰/۰۰۱
	۱۸۳۲۱/۹۴	۳۲	۵۷۲/۵۶		
	۵۸۶۴۷/۰۴	۳۹			

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]



شکل ۱. سطوح کاتالاز موش‌های صحرایی در گروه های هشت گانه تحت مطالعه



شکل ۲. سطوح گلوتاتیون پراکسیداز موش‌های صحرایی در گروه های هشت گانه تحت مطالعه

بحث

بر طبق یافته ها، هشت هفته مصرف ناندرلون اثر آماری معنی‌داری بر کاهش کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز داشت. ناندرلون میزان سنتز پروتئین در عضله را افزایش داده و منجر به هایپرتروفی عضلانی می‌شود (۲۰). از سویی مطالعات حیوانی نشان داده اند سوء مصرف استروئید های آندروژنی آنابولیک مانند ناندرلون با دوز بالا ممکن است پاسخ گشاد کنندگی عروق را منعکس کرده و منجر به پیشبرد اثرات رشد آن بر بافت قلب، به عنوان کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک شود (۲۱). بنابراین ناندرلون در دوزهای فارماکولوژیک منجر به از هم گسیختگی سنسیتیوم بافت قلب و در نتیجه اختلال در عملکرد قلب می‌شود (۳ و ٤) همچنین با تحریک مسیرهای سیگنالینگ سلولی و فعال کردن آبشارهای کاسپازی بقاء

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

سلولی را کاهش داده و منجر به کاردیومیوپاتی و مرگ ناگهانی می‌شود. ناندرلون با افزایش لیپیدهای خون مانند LDL و VLDL و همچنین کاهش HDL منجر به افزایش پروکسیداسیون لیپیدی شده که منجر به ایجاد اختلالات عملکردی قلب می گردد. افزایش پرواکسیداسیون لیپیدی ناشی از مصرف ناندرلون موجب افزایش رادیکال‌های آزاد و کاهش ذخایر آنتی‌اکسیدانی سلولی از جمله گلوتاتیون، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز می‌شود؛ در نتیجه تعادل اکسیدان‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها به هم‌خورده و به دنبال آن مرگ برنامه ریزی شده سلول را منجر می شود (۲۱). همسو با یافته‌های مطالعه حاضر، نتایج مطالعات اخیر در موش‌های تیمار شده با ناندرلون نشان داد به دنبال مصرف ناندرلون میزان آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز به طور معنی داری کاهش می یابد (۱۸).

یافته های تحقیق حاضر نشان داد هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به کاهش آماری معنی دار گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون می گردد، با این وجود اثر معنی دار آماری بر تغییرات کاتالاز نداشت. فعالیت شدید ورزشی منجر به افزایش پراکسیداسیون لیپیدی، افزایش استرس اکسیداتیو و تولید گونه‌های فعال و مختلف رادیکالی و عدم توازن بین سیستم اکسیدانی- آنتی اکسیدانی می‌گردد (۷). علاوه بر فعالیت‌های هوازی، فعالیت‌های ورزشی جسمانی شدید مانند تمرینات مقاومتی موجب کاهش ذخایر آنتی‌اکسیدانی و افزایش گونه‌های فعال رادیکالی می‌شود (۸). گزارش شده است که افزایش استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش‌های مقاومتی و شدید منجر به کاهش آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی نظیر کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز می‌شود (۸، ۹) که با نتایج حاصل از این تحقیق همخوانی دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر به نظر می‌رسد که احتمالاً ناندرلون و ورزش مقاومتی اثرات افزایش در میزان رادیکال‌های آزاد و کاهش ذخایر آنتی‌اکسیدانی آنزیمی بافتی داشته باشند. بنظر می رسد تمرینات مقاومتی اثر معنی داری بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز موش های صحرایی ندارند (۲۲). این یافته با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد. همچنین ورزش‌های با شدت بالا در افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی دارای اثرات متفاوت می باشند و ممکن است سبب در هم شکستن ظرفیت سم‌زدایی ترکیبات اکسیژنی بدن شود؛ لذا در ورزش‌های شدید میزان پروکسیداسیون لیپیدی و آسیب بافتی افزایش یافته و افزایش در ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به همان نسبت دیده نمی‌شود (۲۲). به نظر می رسد، تمرینات ورزشی فعالیت آنزیم‌های اکسیدانی بافت‌ها را با توجه به نوع پروتکل ورزشی، حجم تمرین و وجود دوره‌های استراحت بین تمرین تغییر می‌دهد (۲۳). در مطالعه حاضر احتمالاً به دنبال استرس ناشی از تزریق ناندرلون آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کاهش یافته است؛ در ادامه با سازگاری های ایجاد شده به وسیله تمرینات مقاومتی، احتمالا با فعال شدن سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی، واکنش‌های اکسیداتیو تعدیل شده است؛ در نتیجه تغییری در میزان آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی کالاتاز و GPX رخ نداده است.

در مطالعه حاضر مصرف کروسین اثر آماری معنی‌داری بر کاهش کاتالاز و افزایش گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب موش‌های مسموم شده با ناندرلون داشت. کروسین دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی، افزایش دهنده بقا سلولی و همچنین توانایی پاکسازی رادیکال‌های آزاد می‌باشد. این ماده پروکسیداسیون لیپیدی را کاهش می‌دهد. کروسین دارای خاصیت آنتی‌آپپتوتیک نیز می‌باشد (۱۵، ۲٤). مشخص شده است که مصرف کروسین موجب افزایش پروتئین‌های ضدآپوپتوزی مانند Bcl- 2 و کاهش پروتئین‌های آپوپتوزی مانند Bax و کاسپازهای ۲، ۳ و ۹ می گردد و در نتیجه آبشار کاسپازی مهار شده و بقائ سلولی افزایش می‌یابد (۲۵). در اکثر واکنش‌های تخریبی، کلسیم سیتوزلی به عنوان یک فاکتور اصلی پیشرفت روند تخریب سلولی مطرح می‌باشد (۲۵). از طرفی کروسین با افزایش فعالیت نیتریک اکساید سنتاز آندوتلیال عروق و افزایش نتیریک اکساید (NO) خون‌رسانی به بافت را

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

تسریع کرده و زمینه را برای بهبود عملکرد بافت فراهم می‌کند (۲۶). باتوجه به مطالعات گسترده انجام شده کروسین می‌تواند ریسک فاکتورهای سرمی و بافتی را مهار کرده و زمینه را برای بهبود عملکرد اندام‌ها از جمله قلب فراهم نماید (۱۷). مهاجری و همکاران در تحقیقی به بررسی اثر محافظتی کروسین در موش‌های صحرایی با جیره چرب پرداخته و نشان دادند که کروسین می تواند اثر محافظتی خود را با افزایش عملکرد آنتی‌اکسیدانی کاتالاز ایجاد کند. این نتایج به دلیل استفاده از دوز ۱۰۰ mg/kg با نتایج مطالعه حاضر همخوانی ندارد (۲۷). اگرچه در اغلب مطالعات تجربی که از موش های صحرایی به عنوان آزمودنی استفاده کرده اند به بررسی اثر مصرف کروسین با دوزهای بالا پرداخته شده است با این وجود از دلایل مصرف کروسین با دوزهای پایین ۱۲/۵ mg/kg و mg/kg ۲۵ در مطالعه حاضر می توان به این موضوع اشاره نمود که با توجه به اینکه ناندرلون توسط اغلب ورزشکاران جهت بالا بردن میزان ساخت پروتئین در راستای افزایش اندازه عضله مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، لذا تلاش شد در این مطالعه از دوزهای پایین و همچنین ایمن کروسین استفاده شود که بتوان در مطالعات انسانی از آنها استفاده نمود.

براساس نتایج، تمرین مقاومتی و مصرف همزمان ۱۲/۵mg/kg و ۲۵ mg/kg کروسین نسبت به تمرین مقاومتی به تنهایی اثر بیشتری بر کاهش کاتالاز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون داشت. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمرین مقاومتی همراه با مصرف ۱۲/۵ mg/kg کروسین، همچنین تمرین مقاومتی همراه با مصرف ۲۵ mg/kg کروسین نسبت به مصرف ۱۲/۵ mg/kg کروسین اثرات بیشتری بر کاهش گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون داشت. از اینرو به نظر می رسد تمرین مقاومتی و مصرف همزمان ۱۲/۵mg/kg و mg/kg ۲۵ کروسین دارای اثرات تعاملی کاهنده در میزان کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون داشته باشد، بدین معنی که مصرف ۱۲/۵mg/kg و ۲۵ mg/kg کروسین اثرات کاهنده کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون تمرینات مقاومتی را تشدید نموده است.

باتوجه به اثرات مثبت شناخته شده کروسین و تمرینات ورزشی و عدم همسو بودن یافته های این مطالعه با تحقیقات گزارش شده در این زمینه و همچنین اثرات سمیت ناشی از تزریق ناندرلون می توان بیان نمود که باتوجه به اینکه فعالیت مقاومتی به‌عنوان یک عامل استرس‌زا می‌تواند با تحریک سیستم سمپاتیک و هم‌چنین با افزایش فعالیت رسپتورهای بتا، خون‌رسانی بافت را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی می توان گفت شاید دوز مناسب کروسین برای نشان دادن اثر هم افزایی کروسین و تمرینات مقاومتی انتخاب نشده است. در پایان می توان به این نکته نیز اشاره نمود که تاندرلون و تمرینات ورزشی می‌توانند اثرات افزایشی در فعال کردن واکنشی شوند که در نهایت باعث افزایش روندهای استرس اکسیداتیو شود و اثرات انتی‌اکسیدانی کروسین را تضعیف نمایند؛ از اینرو تعادل اکسیدان- آنتی‌اکسیدانی از بین برود.

نتیجه‌گیری

با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر به نظر می‌رسد در موش های صحرایی مسموم شده با ناندرلون مصرف کروسین منجر به کاهش کاتالاز و افزایش گلوتاتیون پراکسیداز می گردد با این وجود مصرف کروسین همزمان با تمرینات مقاومتی دارای اثرات تعاملی نمی باشد.

تشکر و قدردانی

این مطالعه حاصل پایان‌نامه مقطع دکتری مصوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با کد طرح مصوب IR.MIAU.REC.1396.461 می‌باشد، از کمک‌های معنوی معاونت پژوهش این واحد دانشگاهی تشکر و قدردانی می‌گردد.

تضاد منافع

در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توسط نویسندگان گزارش نشده است.

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

References

1. Karila T. Adverse effects of anabolic androgenic steroids on the cardiovascular, metabolic and reproductive systems of anabolic substance abusers. [Thesis]. Helsinki. Helsinki University. 2003;57-66.

2. Celotti F, Negri Cesi P. Anabolic steroids: a review of their effects on the muscles, of their possible mechanisms of action and of their use in athletics. J Steroid Biochem Mol Biol. 1992;43(5):469-77.

3. Appell HJ, Heller-Umpfenbach B, Feraudi M, Weicker H. Ultrastructural and morphometric investigations on the effects of training and administration of anabolic steroids on the myocardium of guinea pigs. Int J Sports Med. 1983;4:268-74.

4. Cavasin MA, Tao ZY, Yu AL, Yang XP. Testosterone enhances early cardiac remodeling after myocardial infarction, causing rupture and degrading cardiac function. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2006;290(5): H2043-50.

5. Crisostomo PR, Wang M, Wairiuko GM, Morrell ED, Meldrum DR. Brief exposure to exogenous testosterone increases death signaling and adversely affects myocardial function after ischemia. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2006; 290:R1168-74.

6. McNutt RA, Ferenchick GS, Kirlin PC, Hamlin NJ. Acute myocardial infarction in a 22-year-old world class weight lifter using anabolic steroids. Am J Cardiol. 1988;62(1):164-9.

7. Akams A, Best TM. The role of antioxidants in exercise and disease prevention. Med Sci Sports Exerc. 2002;30(5):265-71.

8. Ji LL. Antioxidants and oxidative stress in exercise. Proc Soc Exp Biol Med. 1999;222:706-53.

9. Kelle M, Diken H, Sermet A. Changes in blood antioxidant status and lipid peroxidation distance running. Tr J Med Sci. 1998;28:643-47.

10. Shin YA, Lee JH, Song W, Jun TW. Exercise training improves the antioxidant enzyme activity with no changes of telomere length. J Appl Physiol. 2008;129:254-60.

11. Duthie GG, Robertson JD, Maughhan RJ, Morric PC. Blood antioxidant status and erythrocyte lipid peroxidation following distance running. Arch Biochem Biophys. 1990;282:78-86.

12. Lovlin R, Cotte W, Pyke I, Kavanagh M, Belcastro AN. Are indices of free radical damage related to exercise. Eur J Appl Physiol. 1987;56:313-17.

13. Zarinkamar F, Tajik S. Evaluation of antioxidant activity and phenolic content from saffron organs (Crocus sativus L). JMBS. 2017;8(2):160-170.

14. Javadi B, Sahebkar A, Emami SA. A survey on saffron in major Islamic traditional medicine books. Iranian J Basic Med Sci. 2013;16(1):1-11.

15. Charles DJ. Saffron in antioxidant properties of spices, herbs and other sources. Springer: New York, NY, USA. 2013;509-520.

16. Anunciato TP, da Rocha Filho PA. Carotenoids and polyphenols in nutricosmetics, nutraceuticals, and cosmeceuticals. J Cosmet Dermatol. 2012;11:51-54.

17. Shen XC, Qian ZY. Effects of crocetin on antioxidant enzymatic activities in cardiac hypertrophy induced by norepinephrine in rats. Pharmazie. 2006;61(4):348-52.

18. Chaves EA, Fortunato RS, Carvalho DP, Nascimento JH, Oliveira MF. Exercise-induced cardioprotection is impaired by anabolic steroid treatment through a redox-dependent

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

mechanism. J Steroid Biochem Mol Biol. 2013;138:267-72.

19. Rahgozar A, Ghasemi Hamidabadi H, Shokri S, Moayeri A, Esmaeil Moghadam A. Effect of human chorionic gonadotropin on the destructive effects of nandrolone decanoate on sperm parameters of testes in adult rats. Armaghane-danesh. 2015; 20(9):811-824.

20. Frati P, Busardo FP, Cipolloni L, Dominicis ED, Fineschi V. Anabolic androgenic steroids (AAS) related deaths: autoptic, 31istopathological and toxicological findings. Curr Neuropharmacol. 2015; 13(1):146-59.

21. Ahmadi M, Abbassi-Daloii A, Ziaolhagh S J, Yahyaei B. Structural changes of cardiac tissue in response to boldenone supplementation with or without alcoholic extract of jujuba fruit during resistance training in male Wistar rats. Feyz. 2017;21(6):534-542.

22. Rahbar S, Ahmadiasl N. Effect of long term regular resistance exercise on heart function and oxidative stress in rats. J Ardabil Univ Med Sci. 2012;12(3):256-264.

23. Aksoy Y, Yapanoğlu T, Aksoy H, Demircan B, Öztaşan N, Canakci E, Malkoc I. Effects of endurance training on antioxidant defense mechanisms and lipid peroxidation in testis of rats. Archives of Andrology. 2006;319(4):51-52.

24. Nemati H, Boskabady MH, Ahmadzadeh vostakolaei H. Stimulatory effect of Crocus sativus L. (Saffron) on β2-adrenoreceptors of guinea pig tracheal chains. Phytomedicine 2008;15:1038-45.

25. Xu G, Gong Z, Yu W, Gao L, He S, Qian Z. Increased expression ratio of bcl-2/bax is associated with crocin-mediated apoptosis in bovine aortic endothelial cells. Basic Clin Pharm Toxicol. 2007;100:31-35.

26. Tang FT, Qian ZY, Liu PQ, Zheng SG, He SY, Bao LP. Crocetin improves endothelium-dependent relaxation of thoracic aorta in hypercholesterolemic rabbit by increasing eNOS activity. Biochem Pharm. 2006;72:558-65.

27. Mohajeri D, Rezaie A, Mousavi G, Mazani M, Rezaei-Moghadam A. Protective effects of crocin on hepatic steatosis in the rats fed with high fat diet. J Ardabil Univ Med Sci. 2012;12(2):173-189.

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]

Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences
2018, Volume 6, No.4: 22-32.

Original article

The Effect of Two Months Resistance Training with and without Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase of Heart Tissue of Nandrolone Poisoned Rats

Afshin Rostami[1], Seyed Ali Hosseini [2*], Mohammad Ali Azarbayjani [3]

1. Sport Physiology Department, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran

2. Sport Physiology Department, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran

3. Sport Physiology Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

***Corresponding author*: alihoseini_57@miau.ac.ir**

Keywords:

Nandrolone,

Training,

Crocin, Catalase,

Glutathione Peroxidase

©2018 Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. All rights reserved.

Abstract

***Background & Aim**:* Nandrolone is a testosterone derivative which increases the size of the muscle by increasing protein production. This chemical is sometimes abused by athletes. The aim of present study is to review the effect of resistance training and crocin consumption on catalase and glutathione peroxidase of heart tissue of nandrolone poisoned rats.

***Methods*:** 40 rats were selected and assigned to 8 groups including: 1; control, 2; sham, 3; nandrolone, 4; nandrolone with resistance training, 5; nandrolone with 12.5 mg/kg crocin, 6; nandrolone with 25 mg/kg crocin, 7; nandrolone with resistance training and 12.5 mg/kg crocin, and 8; nandrolone with resistance training and 25 mg/kg crocin. Groups 4, 7 and 8 performed resistance trainings for eight weeks and three sessions per week and groups of 5-8 received daily doses of crocin. To analyze the findings of the study, one-way ANOVA and Bonferron's post hoc tests were used .

***Results*:** 25 mg/kg crocin (P=0.002), training + 12.5 mg/kg crocin (P=0.003), training + 25 mg/kg crocin (P=0.001), significantly reduce the catalase activity; training + 12.5 mg/kg crocin (P=0.001) and training + 25 mg/kg crocin (P=0.001) rather than training have more potent effect on reduction of catalase; 12.5 mg/kg crocin significantly increased glutathione peroxidase (P=0.02).

***Conclusion*:** It appears that co-administration of crocin and resistance training does not have antioxidant interactions in nandrolone poisoned rats.

How to Cite this Article: Rostami A, Hosseini SA, Azarbayjani MA. The Effect of Two Months Resistance Training with and without Crocin Consumption on Catalase and Glutathione Peroxidase of Heart Tissue of Nandrolone Poisoned Rats. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2018;6(4):22-32.

[Downloaded from jms.thums.ac.ir on 2024-10-12]