

بررسی سطح سرمی پروکلسی تونین به عنوان یک بیومارک در بیماران مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی گرگان در سال ۱۳۹۹

امیرعادل جوادی لاریجانی^۱, علی آرین نیا^{۲*}, مهشید مهرجردیان^۳, سهیلا صمدزاده^۴

۱. دانشجوی تخصص جراحی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
۲. استادیار، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
۳. استادیار، متخصص پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
۴. کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار، واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکزآموزشی درمانی بیمارستان پنج آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آپاندکتومی متداول ترین عمل اورژانسی در جهان است. بررسی نقش فاکتور پروکلسی تونین در تشخیص بیماران مشکوک به آپاندیسیت در مطالعات اخیر متفاوت گزارش شده است. این مطالعه با هدف تعیین سطح سرمی پروکلسی تونین در بیماران مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی گرگان در سال ۱۳۹۹ انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، سطح سرمی ۱۲۰ بیمار مشکوک به آپاندیسیت تحت جراحی از نظر پروکلسیتونيین اندازه گیری گردید. گزارش پاتولوژی آپاندکتومی، مبنای تشخیص بیماری تعیین و سطح سرمی پروکلسیتونيین به روش الکتروکمی لومینسانس اندازه گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ تحلیل گردید.

نتایج: نمونه‌های مورد مطالعه شامل بر ۱۲۰ بیمار مشکوک به آپاندیسیت با میانگین سنی $۳۰/۹۶\pm ۱۲/۸۱$ بودند. از بین مشارکت کنندگان ۴۵ نفر (۳۸/۵٪) زن و ۷۵ نفر (۶۱/۵٪) مرد بودند. تعداد ۱۵ مورد (۱۲/۵٪) به عنوان آپاندیسیت کاذب و بقیه (۸۷/۵٪) واقعی بودند. میانگین سطح سرمی پروکلسی تونین در گروه‌های کاذب و واقعی نتیجه پاتولوژی آپاندکتومی معنی دار بود ($p=0.04$). به طوری که میانگین سطح پروکلسیتونيین در گروه آپاندیسیت $۲/۳۰\pm ۰/۸۷$ و در گروه غیر آپاندیسیت $۰/۰۷\pm ۰/۰۳$ بوده است ($p=0.04$).

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که اندازه گیری پروکلسی تونینیمی توانند در رسیدن به تشخیص آپاندیسیت حاد در موارد مشکل کمک کننده باشد.

کلید واژه‌ها:

پروکلسیتونيین، آپاندیسیت،
گرگان

تمامی حقوق نشر برای
دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه محفوظ
است.

مقدمه

تشخیص آپاندیسیت در بیماران مراجعه کننده با درد حاد

شکمی از یک طرف، بر اساس علائم و نشانه‌های بالینی و آزمایشگاهی و از طرف دیگر با رد سایر علل انجام می‌شود (۲). همیشه علایم و نشانه‌های کلاسیک آپاندیسیت وجود ندارد

حدود ۸٪ از جمعیت عمومی در طول سال‌های عمر به

آپاندیسیت مبتلا می‌شوند و شیوع آپاندیسیت کاذب در مردان، زنان و خانم‌های باردار به ترتیب ۲۰، ۱۰ و ۳۰٪ است. آپاندیسیت حاد شایع ترین اورژانس جراحی عمومی است و مداخله جراحی به موقع باعث بهبود نتایج می‌گردد (۲، ۱).

*آدرس نویسنده مسئول: گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی

آدرس پست الکترونیک: aliariannia@gmail.com

که باعث کاهش میزان آپاندیسیت کاذب می‌شوند^(۷) (۷) به همین منظور متخصصین برای افزایش قدرت تشخیص از روش‌های پاراکلینیک مختلفی استفاده می‌کنند. از سالیان دور آزمایش انتخابی برای تشخیص آپاندیسیت شمارش گلبول‌های سفید و درصد پلیمورفونوکلئرها بوده است، اما به علت حساسیت نه چندان بالای این روش در تشخیص آپاندیسیت همواره روش‌های آزمایشگاهی دیگری نیز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یکی از روش‌های پیشنهاد شده استفاده از پروکلسوی تونین است. از آنجایی که پروکلسوی تونین به عنوان یک نشانگر می‌تواند به طور زودرس پاسخ التهابی سیستمیک را که به طور انتخابی در عفونت‌های سیستمیک باکتریائی و قارچی ایجاد می‌شود، توصیف کند^(۹) (۹) و با توجه به شیوع آپاندیسیت و میزان بالای آپاندکتومی کاذب و عوارض جدی و حتی مرگ، تشخیص زودرس و درمان به موقع و مناسب توسط نشانگر زودرس پروکلسوی تونین برای بقای بیماران بسیار حائز اهمیت است. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی سطح سرمی پروکلسوی تونین در بیماران مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی گرگان (بیمارستان ۵ آذر و صیاد) در سال ۱۳۹۹ انجام شد.

روش‌ها

این مطالعه به روش مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش را تمام بیماران مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گرگان در سال ۱۳۹۹ که مورد

و عالیم متفاوتی می‌تواند تشخیص آپاندیسیت حاد را مشکل کند. تاخیر در تشخیص آپاندیسیت با افزایش میزان ناتوانی و مرگ و میر همراه است. در حدود ۱۰ تا ۳۰٪ بیمارانی که آپاندکتومی می‌شوند دارای آپاندیس طبیعی هستند. دقت تشخیص قبل از عمل حدود ۸۵٪ است و اگر این میزان به طور ثابت پایین باشد دال بر افزایش تعداد اعمال جراحی غیرضروری آپاندکتومی است، از سوی دیگر، اگر این میزان به طور ثابتی بالای ۹۰٪ باشد نشانه آن است که بعضی از بیماران دارای آپاندیسیت حاد، جراحی نشده‌اند^(۵-۶) (۵-۶).

پروکلسوی تونین به عنوان یک پروهورمون کلسی تونین یک پلی پپتید ۱۱۶ اسید آمینه یا با وزن مولکولی ۱۳ کیلو دالتون است و توسط سلول‌های C از غده تیروئید در پاسخ به هیپرکلسمی، ترشح می‌شود و با آنزیم‌های پروتئولیتیک به صورت اینتراسلولار به هورمون فعال تبدیل می‌شود^(۶) (۶). پروکلسوی تونین در هنگام سپسیس توسط ماکروفازها و مونوسیت‌های ارگان‌های مختلف تولید و به داخل جریان خون آزاد می‌شود. غلظت خونی آن در افراد سالم کمتر از حد قابل شناسایی است و در التهاب سیستمیک خصوصاً عفونت‌های باکتریال افزایش می‌یابد و در ارتباط قوی با عفونت باکتریال سیستمیک است. مکانیزمی که باعث افزایش تولید پروکلسوی تونین به دنبال التهاب می‌شود، هنوز به طور کامل شناخته نشده است. عقیده بر این است که پروکلسوی تونین توسط کبد و سلول‌های مونونوکلئر خون محیطی، تولید و توسط لیپوبلی ساکاریدها و سایتوکین‌های در ارتباط با سپسیس، تنظیم می‌شود^(۷) (۷). ترشح پروکلسوی تونین حدود چهار ساعت بعد از تحریک شروع می‌شود و آستانه خونی ظرف هشت ساعت حاصل می‌شود. موقوعی که سطح خونی آن افزایش می‌یابد بیشتر به علت تولید خارج تیروئیدی آن در عفونت شدید (باکتریال، قارچی، انگلی) همراه با عالیم سیستمیک، خصوصاً در حضور شوک سپتیک است^(۸) (۸).

تشخیص نادرست آپاندیسیت علاوه بر تحمیل عمل جراحی غیر ضروری به بیمار، عوارض جدی و گاهی کشنده داشته و نهایتاً منجر به عدم بیبود مشکل اصلی پس از عمل و نارضایتی وی از سیستم درمانی خواهد شد^(۹) (۹). جهت افزایش دقت تشخیص چندین سیستم امتیازدهی متفاوت در جهان پیشنهاد شده است

سایر نتایج بین دو گروه مقایسه گردید. سطح سرمی پروکلسوی تونین به روش الکتروکمی لومینسانس اندازه گیری شد. در طول مطالعه محرمانه ماندن اطلاعات فردی شرکت کنندگان، حق خروج از مطالعه و اخذ رضایت آگاهانه کتبی رعایت گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ تحلیل گردید.

نتایج

این مطالعه با مشارکت ۱۲۰ بیمار مشکوک به آپاندیسیت انجام شد. میانگین سنی بیماران ۳۰.۹۶ ± ۱۲.۸۱ سال بود. از بین مشارکت کنندگان، ۴۵ نفر ($۳۸/۵\%$) زن و ۷۵ نفر ($۶۱/۵\%$) مرد بودند. در مطالعه حاضر، بر اساس نتایج پاتولوژی آپاندکتومی از تعداد ۱۲۰ بیمار مشکوک به آپاندیسیت تعداد ۱۵ مورد ($۱۲/۵\%$) به عنوان آپاندکتومی کاذب و ۱۰۵ مورد ($۸۷/۵\%$) واقعی بودند. بر اساس جدول ۱، آپاندیسیت حاد در افرادی که نتیجه پاتولوژی نشان دهنده آپاندیسیت واقعی داشتند، بیشترین فراوانی یعنی ۸۱ مورد ($۶۹/۲\%$) را به خود اختصاص داده است.

جدول ۱. توزیع فراوانی نتایج پاتولوژیکی در بیماران مشکوک به آپاندیسیت

ناتایج پاتولوژیکی	فرابویژه	درصد
Appendix Vermicularis	۱۵	$۱۲/۵$
Acute Appendicitis With Periappendicitis	۱۰	$۷/۷$
Acute Superlative Appendicitis	۶	$۴/۳$
Acute Appendicitis	۸۱	$۶۹/۲$
Acute Appendicitis With Periappendicitis + Consistent With Paratubal Cyst	۲	$۱/۵$
Acute Appendicitis With Periappendicitis + Consistent With Hemorrhagic Corpus Luteom	۲	$۱/۵$
Consistent With Early Acute Appendicitis	۲	$۱/۵$
Acute Suppurate IVE Appendicitis With Periappendicitis	۲	$۱/۵$
Total	۱۲۰	۱۰

مطالعه ۲۸ مورد ($۲۱/۷\%$) بود. میانگین سنی در گروهی با سطح پروکلسوی تونین بیشتر از $۰/۰۵۱ \pm ۰/۰۰$ و در گروه کمتر از $۰/۵ \pm ۰/۷۳$ سال بود. میانگین سنی در گروه مثبت و منفی از نظر پروکلسوی تونین از نظر آماری متفاوت بود ($p=0/002$).

تفاوت معنی داری بین میانگین سطح مارکرهای سرمی (پروکلسوی تونین، نوتروفیل، گلبول های سفید و CRP) در

عمل جراحی قرار گرفتند، تشکیل می دادند. معیار ورود به مطالعه شامل بیماران با بازه سنی $۱۵-۶۵$ سال، عدم ابتلاء به بیماری سیستمیک التهابی زمینه ای و رضایت جهت شرکت در مطالعه بود. از بیماران فوق بعد از اخذ شرح حال و انجام معاینات اولیه و آزمایشات لازم که منجر به تشخیص آپاندیسیت گردید، آزمایش پروکلسوی تونین (PCT) (بدون دریافت هزینه اضافی) با استفاده از نمونه خون انجام شد و در نهایت (بدون توجه به نتیجه این آزمایش) براساس معیارهای آلوارادو بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

متغیرهای مطالعه شامل سن، جنسیت بیماران، علایم و نشانه های بالینی بیماران، مدت زمان گذشته از شروع علایم، شمارش گلبول های سفید و نوتروفیل ها، ارزیابی کیفی پروکلسوی تونین (PCT) و پروتئین واکنشی C (CRP) بود. گزارش پاتولوژی آپاندکتومی، مبنای تشخیص بیماری تعیین شد. بر این اساس بیماران در دو گروه آپاندیسیت کاذب و آپاندیسیت واقعی تقسیم شده و یافته های آزمایشگاهی و

جدول ۱. توزیع فراوانی نتایج پاتولوژیکی در بیماران مشکوک به آپاندیسیت

در مجموع، میانگین سطح پروکلسوی تونین در شرکت کنندگان در مطالعه $۱۰/۹۳ \pm ۲/۵۹$ نانوگرم/میلی لیتر بود. بر اساس آزمون تی مستقل این میزان در بین مردان $۱۷/۱۳ \pm ۰/۲۰$ و زنان $۰/۲۰ \pm ۱/۱۷$ و $۰/۰۳ \pm ۲/۰۵$ متفاوت بود ($p=0/003$).

با توجه به اینکه در مطالعات قبلی سطح پروکلسوی تونین بالاتر از $۰/۵$ (نانوگرم/میلی لیتر) به عنوان نتیجه مثبت در نظر گرفته شده است ($۱۱/۰$ ، $۱۰/۱$)، فراوانی پروکلسوی تونین های مثبت در این

بیماران آپاندیسیت کاذب و آپاندیسیت واقعی مراجعه کننده وجود داشت (جدول ۲).

جدول ۲. میانگین و انحراف معیار مارکرهای سرمی بر حسب نتیجه پاتولوژی آپاندکتومی

مارکرهای سرمی	نتیجه پاتولوژی	میانگین	سطح معنی داری
نوتروفیل (cells/mm ³)	آپاندیسیت واقعی	۷۸/۴۷±۱۱/۹۶	*۰/۰۰۶
پروتئین واکنشی ۵ (میلی گرم بر لیتر)	آپاندیسیت کاذب	۶۵/۶۳±۱۲/۰۸	
گلبول های سفید (نانولیتر)	آپاندیسیت واقعی	۷۰/۶۱±۲۱/۹۲	*۰/۰۶
پروکلسوی تونین (نانوگرم/میلی لیتر)	آپاندیسیت کاذب	۶۶/۰۱±۱۸/۳۱	
آپاندیسیت کاذب	آپاندیسیت واقعی	۱۳۰۱۴/۰۴±۳۸۱۲/۷۳	*۰/۰۲
آپاندیسیت کاذب	آپاندیسیت واقعی	۹۸۲۵/۰۰±۲۲۲۴/۶۹	
آپاندیسیت کاذب	آپاندیسیت واقعی	۲/۳۰±۸/۷۵	*۰/۰۴
آپاندیسیت کاذب	آپاندیسیت واقعی	۰/۰۷±۰/۰۳	

*آزمون تی مستقل

تشخیص دقیق و قطعی آپاندیسیت حاد همچنان از مشکلات جراحی است. استفاده از علائم و نشانه ها و یافته های آزمایشگاهی در این راه بسیار کمک کننده است. تاکنون مطالعات متعددی درخصوص بررسی نقش آزمایشات در تشخیص بیماران مشکوک به آپاندیسیت حاد انجام شده است. در مطالعه Sand و همکاران مشخص گردید که بکارگیری دقیق علایم بالینی بدون استفاده از تست های اضافی آزمایشگاهی می تواند بطور قابل اعتمادی آپاندیسیت را تشخیص دهد و توصیه شده که تست های اضافی آزمایشگاهی برای موارد مشکوک و بینابینی انجام شود (۱۲).

در مطالعه حاضر، از تعداد ۱۲۰ بیمار مشکوک به آپاندیسیت تعداد ۱۵ مورد (۱۲/۵٪) به عنوان آپاندیسیت کاذب و اکثریت (۸۷/۵٪) به آپاندیسیت واقعی مبتلا بودند. در مطالعه وزیری و همکاران در سال ۲۰۱۴، حساسیت و ویژگی اندازه گیری سطح PCT برای تشخیص حاد آپاندیسیت به ترتیب ۴۴ و ۱۰۰٪ بود. مقدار PCT با شدت آپاندیسیت و همچنین با وجود پریتونیت و عفونت در محل جراحی افزایش داشت (۱۴). در مطالعه محبی و همکاران نیز میزان موارد آپاندیسیت کاذب در بیماران ۱۸٪ ذکر شده است و سن کمتر از ۲۱ سال، جنسیت مؤنث و سطح پائین نوتروفیل ها پیش بینی کننده ای برای موارد آپاندیسیت کاذب در بیماران مشکوک به آپاندیسیت گزارش شده است (۱۵). در مطالعه دیگری نیز از ۱۰۰ بیمار

همچنین از بین ۱۲۰ بیمار مشکوک به آپاندیسیت، ۱۱۰ مورد (۹۱/۷٪) از نظر تعداد نوتروفیل ها مثبت و ۲۸ نفر (۳۱/۶٪) CRP بالاتر از حد نرمال داشتند. میانگین سطح پروکلسوی تونین در گروه مبتلا به آپاندیسیت واقعی ۲/۳۰±۸/۷۵ و در گروه آپاندیسیت کاذب ۰/۰۷±۰/۰۳ بود. اختلاف میانگین سطح پروکلسوی تونین در گروه های کاذب و واقعی با توجه به نتیجه آزمایش پاتولوژی آپاندکتومی، از نظر آماری معنی دار بود (p=۰/۰۰۴). به عبارت دیگر در بیماران آپاندیسیت واقعی، سطح سرمی کلسوی تونین نسبت به گروه آپاندیسیت کاذب بالاتر بود.

بحث

آپاندیسیت حاد، یکی از شایعترین اورژانس های جراحی می باشد. شیوع آپاندکتومی کاذب در بیماران مردان و زنان و همینطور خانم های باردار به ترتیب ۱۰٪، ۲۰٪ و حدود ۳۰٪ است. به همین منظور متخصصین برای افزایش قدرت تشخیص از روش های پاراکلینیک مختلفی استفاده می کنند. از سالیان دور آزمایش انتخابی برای تشخیص آپاندیسیت شمارش گلبول های سفید و درصد پلی مورفونوکلئرها بوده است، اما به علت حساسیت نه چندان بالای این روش در تشخیص آپاندیسیت همواره روش های آزمایشگاهی دیگری نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند (۱۲). لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح سرمی پروکلسوی تونین در بیماران مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی گرگان انجام گردید.

های بالینی همراه با آزمایش CRP و WBC و درصد نوتروفیلی می‌تواند دقت تشخیصی را بالا ببرد و به طور واضح و مشخص میزان پرفوراسیون و لاپاراتومی منفی را کاهش می‌دهد (۲۱). در مطالعه‌ای Rodriguez و همکاران که بر روی کودکان انجام شده است نشان داد که در آپاندیسیت حاد مقدار CRP افزایش می‌یابد و همچنین این مقدار افزایش با شدت التهاب مرتبط است. اما استفاده از حالت ترکیبی CRP با شمارش لکوسیتی موثرتر است (۲۲). یکی از فاکتورهای مورد ارزیابی که در حقیقت فاکتوری جدیدتر می‌باشد، اندازه گیری CRP است. که برای تشخیص آپاندیسیت حاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه حساسیت این تست معمولاً بالا است اما ویژگی آن پایین می‌باشد. در مطالعه‌ای Yang و همکاران که در همین راستا انجام شده است گزارش شده است که یافته‌های آزمایشگاهی غیرطبیعی نمی‌تواند یقیناً تشخیص آپاندیسیت حاد را مسجل کنند. هرچند آپاندیسیت حاد وقتی که شمارش لکوسیتی، درصد نوتروفیلی و مقدار CRP نرمال باشند، بسیار غیرمحتمل است (۲۳).

از محدودیت‌های این مطالعه می‌توان به عدم تعمیم نتایج به کل جامعه آماری اشاره کرد. با توجه به اینکه بیماران این مطالعه مراجعه کنندگان به بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهر گرگان می‌باشد، بنابراین عمومیت دادن نتیجه‌ی بدست آمده از آن برای تمام بیماران از آن نوع جمعیت پایه، وسوسه کننده‌ی می‌باشد. ولی چون بیمارانی که به این بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند اغلب نماینده‌ی تمام آن بیماران در آن جامعه نیستند، بنابراین عمومیت دادن نتیجه‌های بدست آمده از بررسی آن‌ها به کل جامعه مبنایی منطقی ندارد. البته این نکته به این معنی نیست که انجام یک پژوهش در یک بیمارستان نمی‌تواند ارزش داشته باشد، ولی چنین پژوهش‌هایی تمایل به تورش‌های انتخاب بیمار دارد و همواره هنگام عمومیت دادن نتیجه‌های این نوع پژوهش‌ها، باید امکان وجود این تورش را مد نظر قرار داد. پیشنهاد می‌گردد در آینده مطالعاتی با حجم نمونه بالاتر و در سطح چند استان انجام گردد.

نتیجه‌گیری

اندازه گیری سطح سرمی پروکلسی تونین جهت تایید تشخیص آپاندیسیت واقعی می‌تواند کمک کننده باشد. به نظر می‌رسد

مشکوک به آپاندیسیت، ۸۳٪ به عنوان آپاندیسیت واقعی و ۱۷٪ آپاندیسیت کاذب بود (۱۶). در همین راستا، پژوهش دیگری که بر روی ۱۲۵ بیمار مشکوک به آپاندیسیت در خرم آباد انجام شده بود، از نظر نتایج پاتولوژی نمونه‌های برداشته شده از آپاندیس ۸۸٪ تشخیص آپاندیسیت واقعی و بقیه آپاندیسیت کاذب بودند (۱۷). مطیع و همکاران نیز نشان دادند که از ۲۲۰ بیمار مشکوک به آپاندیسیت، بعد از بررسی نتایج پاتولوژی تعداد ۱۲۵ بیمار آپاندیسیت واقعی و ۲۱ نفر مبتلا به آپاندیسیت کاذب بودند (۱۸).

در مطالعه حاضر، میانگین سطح سرمی پروکلسی تونین در بیماران مبتلا به آپاندیسیت واقعی و آپاندیسیت کاذب با توجه به نتیجه پاتولوژی آپاندکتومی، متفاوت بود. به طوری که میانگین سطح سرمی پروکلسی تونین در آپاندیسیت واقعی نسبت به آپاندیسیت کاذب بالاتر بود که اختلاف آن نیز حائز اهمیت است. در مطالعه مطیع و همکاران میانگین سطح سرمی پروکلسی تونین ۲/۰ با انحراف معيار ۰/۲۱ بود، اما تفاوتی بین افرادی که آپاندیسیت واقعی داشتند و افراد با آپاندیسیت کاذب از نظر آماری وجود نداشت. همچنین حساسیت تست پروکلسی تونین ۵۵٪ و ویژگی آن ۲۹٪ گزارش شد (۱۶). در مطالعه حقی و همکاران اگرچه میانگین سطح سرمی پروکلسی تونین گزارش نشد، اما در گروه آپاندیسیت کاذب تنها ۲۰٪ از بیماران سطح پروکلسی تونین بالاتر از ۰/۵ و در بیماران آپاندیسیت واقعی حدود ۶۰٪ سطح سرمی پروکلسی تونین بالاتر از ۰/۵ داشتند. همچنین حساسیت و ویژگی پروکلسی تونین برای تشخیص آپاندیسیت واقعی در بیماران مشکوک به آپاندیسیت به ترتیب ۶۵ و ۸۰٪ گزارش شد (۱۹). به همین ترتیب، در یک مطالعه مروری نظام مندکه توسط Acharya و همکاران انجام شد، حساسیت و ویژگی پروکلسی تونین برای تشخیص آپاندیسیت واقعی به ترتیب ۳۶٪ و ۸۸٪ و برای تشخیص آپاندیسیت پاره شده به ترتیب ۶۹٪ و ۶۷٪ بود (۲۰).

در مطالعه حاضر به جز CRP، میانگین سطح مارکرهای سرمی نوتروفیل و گلبول‌های سفید در بیماران آپاندیسیت و غیرآپاندیسیت مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی معنی دار بود. در رابطه با CRP در مطالعه Mohammed و همکاران انجام شده در لیبی بیان شده است که ارزیابی علائم و نشانه

مشارکت نویسندها:

- (۱) مفهوم پردازی و طراحی مطالعه، یا جمع آوری داده‌ها، یا تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها: امیر عادل جوادی لاریجانی، علی آرین نیا، مهشید مهرجردیان، سهیلا صمدزاده
- (۲) تهیه پیش‌نویس مقاله یا بازبینی آن جهت تدوین محتواهای اندیشمندانه: امیر عادل جوادی لاریجانی، علی آرین نیا، مهشید مهرجردیان
- (۳) تایید نهایی دستنوشته پیش از ارسال به مجله: امیر عادل جوادی لاریجانی، علی آرین نیا، مهشید مهرجردیان، سهیلا صمدزاده

شرح حال و معاینات بالینی مهم ترین نقش را در تشخیص آپاندیسیت واقعی داشته باشد. لیکن در موارد استثنائی و مشکوک برای تایید بیشتر معاینات بالینی و سایر آزمایش‌های معمول شاید بتوان با بهره‌گیری از آزمایشات اختصاصی تر مانند پروکلسی تونین قضاوت مناسب تری داشت.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله نویسندها از کلیه افرادی که در مراحل نگارش این مقاله همکاری کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

تضاد منافع

در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی توسط نویسندها گزارش نشده است.

References

۱. Cheloni R, Gandolfi SA, Signorelli C, Odone A. Global prevalence of diabetic retinopathy: protocol for a systematic review and meta-analysis. *BMJ open*. ۲۰۱۹;۹(۳):e۰۲۲۱۸۸.
۲. Danwang C, Mazou TN, Tochie JN, Nzalie RNT, Bigna JJ. Global prevalence and incidence of surgical site infections after appendectomy: a systematic review and meta-analysis protocol. *BMJ open*. ۲۰۱۸;۸(۸):e۰۲۰۱۰۱.
۳. Barlas S, Günerhan Y, Palancı Y, İşler B, Çağlayan K. Epidemiological and demographic features of appendicitis and influences of several environmental factors. *Turk J Trauma Emerg Surg*. ۲۰۱۰;۱۶(۱):۳۸-۴۲.
۴. Arslan S, Aydogdu B, Arslan MS, Zeytun H, Okur MH, Basuguy E, et al. Analysis of Risk Factors for Appendicitis in Children: A Multicenter Epidemiological Study. *Dicle Tıp Dergisi*. ۲۰۱۶;۴۳(۴):۵۵۶-۶۰.
۵. Köksal H, Uysal B, Saribabiçi R. Bir devlet hastanesinin akut apandisit tecrübe/acute appendicitis experience of a state hospital. *Eurasian Journal of Emergency Medicine*. ۲۰۱۰;۹(۱):۴۱.
۶. Dal F, Cicek Y, Pekmezci S, Kocazeybek B, Tokman HB, Konukoglu D, et al. Role of Alvarado score and biological indicators of C-reactive protein, procalcitonin and neopterin in diagnosis of acute appendicitis. *Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery*. ۲۰۱۹;۲۵(۳):۲۲۹-۳۷.
۷. MENGÜCÜK ME. Akut apandisit tanısı ile opere edilen hastalarda negatif eksplorasyon oranını azaltmak için prokalsitonin, C-RP ve neopterin kullanılır mı?/Can the negative exploration ratio in patients who have been operated as acute appendicitis be decreased by use of procalcitonin, C-RP and neopterin or not? ۲۰۰۶.
۸. Torgutalp M, Kinikli S, Yayla ME, Okatan IE, Kinikli G. Serum Procalcitonin as a Marker for Differential Diagnosis Between Bacterial Pneumonia and Scleroderma-related Lung Disease/Skleroderma İlliskili interstisyel Akciger Hastalığı ve Bakteriyel Pnomoni'nin Ayırıcı Tanısında Prokalsitonin Duzeylerinin Degerlendirilmesi. *Journal of Ankara University Faculty of Medicine*. ۲۰۲۰;۷۳(۱):۱۴-۲۰.
۹. Sumer S, Erayman I, Aribas E. The role of procalcitonin, C-reactive protein, interleukin-6, interleukin-8 and endotoxin in the early diagnosis and follow-up of local infections. *ORGAN*. ۲۰۱۲;۴۲:۴۵.
۱۰. Lee H. Procalcitonin as a biomarker of infectious diseases. *The Korean journal of internal medicine*. ۲۰۱۳;۲۸(۳):۲۸۵.
۱۱. Yamashita H, Yuasa N, Takeuchi E, Goto Y, Miyake H, Miyata K, et al. Diagnostic value of procalcitonin for acute complicated appendicitis. *Nagoya journal of medical science*. ۲۰۱۶;۷۸(۱):۷۹.
۱۲. Billiar T, Andersen D, Hunter J, Brunicardi F, Dunn D, Pollock RE. Schwartz's principles of surgery: McGraw-Hill Professional; ۲۰۰۴.
۱۳. Sand M, Gelos M, Bechara FG, Sand D, Wiese TH, Steinstraesser L, et al. Epiploic appendagitis—clinical characteristics of an uncommon surgical diagnosis. *BMC surgery*. ۲۰۰۷;۷(۱):۱-۷.
۱۴. Vaziri M, Ehsanipour F, Pazouki A, Tamannaie Z, Taghavi R, Pishgahroudsari M, et al. Evaluation of procalcitonin as a biomarker of diagnosis, severity and postoperative complications in adult patients with acute

- appendicitis. Medical journal of the Islamic Republic of Iran. ۲۰۱۴;۲۸:۵۰.
۱۵. Mohebbi HA, Mehrvarz S, Kashani MT, Kabir A, Moharamzad Y. Predicting negative appendectomy by using demographic, clinical, and laboratory parameters: a cross-sectional study. international journal of surgery. ۲۰۰۸;۶(۲):۱۱۵-۸.
۱۶. Mohebbi H, MEHRVARZ S, Khorrami M. Evaluation of serum CRP, procalcitonin and WBC in the diagnosis of acute appendicitis. ۲۰۱۱.
۱۷. Nejad A. Study of sonography sensitivity and specificity to the diagnosis of acute appendicitis in suspected patients referred to Khorramabad Ashayer hospital. Yafteh. ۲۰۱۲;۱۳(۴):۲۳-۷.
۱۸. Motie M, Mousavi M, Behnampour N, Mortazavy B, Kalany M. Accuracy of ultrasonography in diagnosis of acute appendicitis. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. ۲۰۱۰;۱۱(۴):۷۰-۱۶.
۱۹. Haghi AR, Kasraianfard A, Monsef A, Kazemi AS, Rahimi S, Javadi SMR. The diagnostic values of procalcitonin and interleukin ۶ in acute appendicitis. Turkish journal of surgery. ۲۰۱۹;۳۵(۱):۱۹.
۲۰. Acharya A, Markar SR, Ni M, Hanna GB. Biomarkers of acute appendicitis: systematic review and cost–benefit trade-off analysis. Surgical endoscopy. ۲۰۱۷;۳۱(۳):۱۰۲۲-۳۱.
۲۱. Mohammed AA, Daghman NA, Aboud SM, Oshibi HO. The diagnostic value of C-reactive protein, white blood cell count and neutrophil percentage in childhood appendicitis. Saudi medical journal. ۲۰۰۴;۲۵(۹):۱۲۱۲-۵.
۲۲. Rodríguez-Sanjuán JC, Martín-Parra JI, Seco I, García-Castrillo L, Naranjo A. C-reactive protein and leukocyte count in the diagnosis of acute appendicitis in children. Diseases of the colon & rectum. ۱۹۹۹;۴۲(۱۰):۱۳۲۵-۹.
۲۳. Yang HR, Wang YC, Chung PK, Chen WK, Jeng LB, Chen RJ. Laboratory tests in patients with acute appendicitis. ANZ journal of surgery. ۲۰۰۶;۷۶(۱-۲):۷۱-۴.

Evaluation of the serum procalcitonin level as a biomarker in patients with suspected appendicitis referred to academic hospitals of Gorgan,

۲۰۲۰

Amir Adel Javadi Larijani^۱, Ali Ariannia^۱, Mahshid Mehrjerdiān^۱, Soheila Samadzadeh^۲

^۱. Resident of general surgery, Department of general surgery, School of Medicine, Golestan University of medical sciences, Gorgan, Iran

^۲. Assistant Professor, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

^۳. Assistant Professor, School of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

^۴. Master of Software Technology Engineering, Clinical Research Development Unit (CRDU), Azar Hospital, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

Corresponding author: aliariannia@gmail.com

Abstract

Background & Aim: Appendectomy for acute appendicitis is the most common emergency procedure in the world. The diagnostic value of procalcitonin factor in detection of patients with suspected appendicitis has been reported somewhat confusing in recent studies. Therefore, the aim of this study was to determine the level of procalcitonin in patients with suspected appendicitis referred to Azar and Sayad Hospital, Gorgan, Iran, in ۲۰۲۰.

Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, the serum procalcitonin levels were measured in ۱۲۰ patients with suspected appendicitis who underwent appendectomy surgery. The histopathology reports of appendectomy was the basis for diagnosis and the serum levels of procalcitonin were measured by chemiluminescence method. Data were analyzed using SPSS software (version ۱۹.۰, SPSS, Chicago, IL, USA).

Results: In general, the mean age of ۱۲۰ patients participated in this study was ۳۰.۹۶ ± ۱۲.۸۱. Women comprised ۳۸.۵% (۴۵ patients) of the study population. The false and true appendectomy rate for appendicitis was ۱۵ (۱۲.۵%) and ۱۰۵ cases (۸۷.۵%), respectively. The difference between the mean levels of procalcitonin in the false and true appendectomy cases was statistically significant ($p = .001$). The mean level of procalcitonin in the true and false appendectomy cases was ۲.۳ ± ۰.۷۸ and ۰.۷ ± ۰.۰۲ ($P = .001$), respectively.

Conclusion: The results of this study indicate that the measurement of procalcitonin levels can be helpful in diagnosing acute appendicitis in complicated cases.

How to Cite this Article: Javadi Larijani AA, Ariannia A, Mehrjerdiān M, Samadzadeh S. Evaluation of the serum procalcitonin level as a biomarker in patients with suspected appendicitis referred to academic hospitals of Gorgan, ۲۰۲۰. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. ۱۴۲۱;۹(۲):۲۴-۳۲.

*آدرس نویسنده مسئول: مرکز رشد و فناوری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.